



## ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

**Туберкулез** - это опасное инфекционное заболевание, которое, чаще всего, передается от больного человека к здоровому при кашле, разговоре, чихании.

### ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ:



СЛАБОСТЬ, РАЗБИТОСТЬ,  
ПОТЛИВОСТЬ,  
ПОВЫШЕННАЯ УТОМЛЕМОСТЬ,  
СНИЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ,  
УХУДШЕНИЕ ПАМЯТИ

ОТСУСТВИЕ АППЕТИТА,  
ПОХУДАНИЕ ЗА КОРОТКИЙ  
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО  
37,0-37,3 °C

ПОДКАШЛИВАНИЕ

### РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

У подростков для выявления начальных признаков туберкулеза легких проводятся флюорографическое обследование и иммунодиагностика.

Всем детям с 12 месяцев до 7 лет для выявления инфицирования микобактериями туберкулеза проводится внутрикожная диагностическая пробы Манту, а с 8 до 17 лет используется пробы с Диаскинтом.

Профилактика туберкулеза среди детского населения проводится путем иммунизации вакциной БЦЖ впервые в родильном доме и ревакцинация в возрасте 6-7 лет.

Уважаемые родители! В случае впервые положительных результатов реакции Манту и Диаскинта вас могут направить к врачу-фтизиатру, к которому необходимо обратиться, имея на руках сведения о всех предыдущих пробах и данные о прививках БЦЖ.

**Помните!** Вакцинация БЦЖ - самая эффективная защита Вашего ребенка от туберкулеза, а пробы Манту и пробы с Диаскинтом - надежные и безопасные методы раннего выявления заболевания.